

OPERACIJA HEMOROIDOV

Hemoroidalna bolezen nastane, ko se hemoroidi, venski pleteži v zadnjiku zadebelijo, otečejo ali vnamejo in nastanejo povečani hemoroidi. Ločimo notranje in zunanje. Potrdimo jih s proktoskopijo. Rizični dejavniki za nastanek hemoroidov so: kronična zaprtost, dolgotrajna driska, nosečnost, kronična bolezen jeter.

Kadar nastane v hemoroidu tromb, je potrebna urgentna operacija:

- hemoroidalna trombektomija (v lokalni anesteziji; z rezom se sprostijo nastali trombi v hemoroidu).

Navodila po odpustu:

- analgetiki za lajšanje bolečin, ev. antibiotik,
- skrbna analna nega (tuširanje po vsakem odvajanju),
- masaža zadnjične odprtine z oljnim oljem,
- skrb za redno odvajanje mehkega blata.

Možni zapleti:

- krvavitev,
- bolečina,
- vnetje,
- povišana temperatura,
- motnje pri odvajanju blata,
- zožitev mišice zapiralke,
- inkontinenca za blato.

Hospitalizacija: predvidoma 1 dan, lahko se podaljša, dokler pacient ne odvaja blata. Okrevanje do 1,5 meseca.